

# Perfil dos pacientes em hemodiálise com o KTV inadequado em três meses consecutivos

Mayra Cristina P. Guimarães, Bruna Vieira, Jacemir Samerdak, Jyana G. Morais, Carlos Eduardo S. Noleto, Carlos Alberto Rost, Marcos Alexandre Vieira, Hercílio Alexandre da Luz Filho

## OBJETIVO

Avaliar o perfil dos pacientes em hemodiálise (HD) com KTV (medida de adequação de hemodiálise) inadequado nos últimos três meses.

## MATERIAIS E MÉTODOS

### Desenho do estudo:

Estudo Descritivo Observacional.

### Pacientes:

N= 106 pacientes de unidade de hemodiálise de Joinville. Todos tinham prescrição médica de três sessões de hemodiálise por semana (4h00min cada sessão).

### N= 106 pacientes

Considerados com Kt/v inadequado os que apresentaram resultado  $<1,2$  em três meses consecutivos.

## DADOS ANALISADOS

- Idade;
- Gênero;
- Tempo de diálise;
- Doenças de base;
- Acesso para hemodiálise;
- Tempo de sessão;
- Fluxo da bomba de sangue.

## RESULTADOS

**18 (17%) PACIENTES APRESENTARAM KTV INADEQUADO ( $<1,2$ )**

**Tabela 1.** Características dos pacientes que apresentaram Kt/v inadequado por três meses consecutivos (N= 18).

Sexo Masculino (%)	<b>100</b>
Idade (anos)	<b>48,6 ± 15,9</b>
Tempo de Hemodiálise (meses)	<b>32,5 (8,7-59,3)</b>
Portadores de HAS (%)	<b>94</b>
Acesso Por FAV (%)	<b>89</b>
Acesso por Cateter (%)	<b>11</b>

## CONCLUSÃO

Foi verificado que os pacientes com Kt/v inadequado nos últimos três meses eram todos homens, a doença de base predominante foi HAS, boa parte hemodialisavam por fístula artério venosa e não eram aderentes ao tratamento.